



Accademia Italiana
della Vite e del Vino



CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE
IN AGRICOLTURA

L'EVOLUZIONE VARIETALE DEL VIGNETO ITALIA NEGLI ULTIMI 150 ANNI

A. Costacurta, L. Bavaresco
IL PRESENTE – DAL 1970 AI GIORNI
NOSTRI

DIRETTIVA CEE 09.04.1968

RECEPITA DA

-D.P.R. n°1164 del 24.12.1969

-NORMATIVA CEE n°816 del 1970

-1970 CENSIMENTO

EVOLUZIONE DELLA SUPERFICIE VITATA NAZIONALE (ha x 1000)

1970	1982	1990	2000	2010	Variazioni (%)
1109	1060	870	720	630	-41.4

EVOLUZIONE DELLA SUPERFICIE VITATA NAZIONALE IN ALCUNE REGIONI (ha x 1000)

Regioni	1970	2010	Sup. persa	Perdita (%)
Piemonte	97.0	47.0	50.0	-51.6
Veneto	123.0	73.5	49.5	-40.0
Emilia Romagna	103.0	56.0	47.0	-45.7
Toscana	87.0	57.0	30.0	-34.5
Campania	53.0	21.0	32.0	-60.0
Puglia	145.0	96.0	49.0	-34.0
Sicilia	146.0	110.0	36.0	-24.7
Sardegna	62.0	19.0	43.0	-69.6

EVOLUZIONE DELLA SUPERFICIE VITATA NAZIONALE IN ALCUNI VITIGNI (ha x 1000)

Vitigni	1970		2000		2010		Tend.
	Sup.	%	Sup.	%	Sup.	%	
Sangiovese	75.2	6.8	70.0	10.3	70.3	11.2	+
Trebbiano t.	58.3	5.3	42.4	6.3	38.3	6.1	+/-
Catarratti	77.1	7.0	50.1	7.0	37.8	6.0	-
Montepulciano	26.5	2.4	30.0	4.4	31.0	4.9	+
Merlot	53.1	4.8	25.6	3.8	24.1	3.8	-
Barbera	80.5	7.3	28.3	4.5	21.3	3.4	-
Nero d'Avola	15.7	1.4	11.4	1.7	18.5	2.9	+
Negroamaro	42.3	3.8	16.8	2.5	16.6	2.6	-
Chard. (Pinot b.)	2.7	0.2	11.8	1.8	16.5	2.6	+
Trebb. romagnolo	27.0	2.4	20.0	2.8	16.3	2.6	=

EVOLUZIONE DELLA SUPERFICIE VITATA NAZIONALE IN ALCUNI VITIGNI (ha x 1000)

Vitigni	1970		2000		2010		Tend.
	Sup.	%	Sup.	%	Sup.	%	
Prosecco (Glera)	6.2	0.6	8.1	1.1	16.1	2.6	+
Cab. fr. e Sauv.	-				15.9	2.5	+
Moscato b.	10.7				11.7	1.9	+
Garganega	13.8	1.2			11.3	1.8	+
Primitivo		4.3	7.1	1.2			-
Aglianico			7.1				-
Pinot g.			6.1	1.1			+
Malvasia		3.2	12.1	1.9	8.7	1.4	-
Syrah		-	1.0	0.1	7.1	1.1	+
Ansonica	9.0	0.7	9.4	1.3	6.8	1.1	

Rossi 54%
Bianchi 46%

Rossi 60%
Bianchi 40%

Rossi 56%
Bianchi 44%

DIMINUZIONE DELLA SUP. VITATA NAZ. DI ALCUNI VITIGNI DAL 1970 AL 2010

Vitigni	Sup. - (ha x 1000)	Sup. - %
Barbera	60	73.6
Catarratti	40	48.1
Trebbiano t.	40	31.4
Primitivo	35	76.6
Merlot	30	54.6
Malvasia	30	14.3
Negroamaro	25	41.0

AUMENTO DELLA SUP. VITATA NAZIONALE DI ALCUNI VITIGNI DAL 1970 AL 2010

Vitigni	Sup. + (ha x 1000)
----------------	-------------------------------

Prosecco (Glera)	10
-------------------------	-----------

Cab. Sauv.	16
-------------------	-----------

Pinot g.	10
-----------------	-----------

Syrah	7
--------------	----------

Chard. (Pinot b.)	15
--------------------------	-----------

Montepulciano	5
----------------------	----------

Nero d'Avola	3
---------------------	----------

**DIMINUZIONE DELLA SUP. VITATA NAZ.
DI ALCUNI VITIGNI DAL 2000 AL 2010**

Vitigni	Sup. - (ha x 1000)	Sup.- %
Tocai f.	3.3	70.3
Barbera	7.0	25.0
Catarratti	13.0	25.5
Trebbiani	16.0	20.5
Pignoletto	5.5	80.0
Carmenère	3.1	44.2
Malvasie	3.1	66.1

AUMENTO DELLA SUP. VITATA NAZIONALE DI ALCUNI VITIGNI DAL 2000 AL 2010

Vitigni	Sup. + (ha x 1000)	Sup. %
Prosecco (Glera)	8.0	98.2
Cab. fr. e Sauv.	7.8	97.6
Nero d'Avola	7.0	62.0
Syrah	6.1	590.0
Chardonnay	4.7	40.3
Grillo	4.3	240.0
Pinot g.	3.4	50.8
Primitivo	3.2	40.0
Corvina	1.3	27.0
Falanghina	1.1	64.0
Altri (Pecorino, Segrantino, Fiano, Grechetti)		

EVOLUZIONE DELLA SUPERFICIE VITATA VENETA (ha x 1000)

1970

1982

1990

2000

2010

123

96

75

73.7

73.7

EVOLUZIONE DELLA SUPERFICIE VITATA VENETA IN ALCUNE PROVINCIE (ha x 1000)

Prov.	1982	1990	2000	2010	Perdite	%
VR	25.00	23.50	24.00	25.80	-	-
VI	12.00	9.80	23.00	7.10	4.90	40.8
TV	28.00	27.00	26.00	27.00	1.00	3.6
VE	11.60	8.90	6.80	6.30	5.30	45.7
PD	15.40	10.60	7.70	5.50	9.90	64.3
RO	20.00	1.40	0.70	0.25	19.75	98.8

EVOLUZIONE DELLA SUPERFICIE. VITATA VENETA

IN ALCUNI VITIGNI (ha x 1000)

Vitigni	1982		2000		2010		Tend.
	Sup.	%	Sup.	%	Sup.	%	
Merlot	31.80	33.1	15.10	20.5	7.73	10.5	-
Garganega	12.05	12.6	11.10	15.1	10.10	13.7	=
Corvina	5.00	5.2	4.70	6.4	6.80	9.2	+
Rondinella	3.10	3.2	2.70	3.7	2.6	3.5	=
Cab. fr. e Sauv.	4.80	5.0	6.80	9.2	12.50	17.0	+
Prosecco (Glera)	5.80	6.0	7.87	10.7	16.00	21.7	+
Charardonnay	2.00	2.1	4.50	6.1	4.20	5.7	+
Pinot g.	0.31	0.3	2.40	3.3	7.24	9.8	+
Tocai f.	3.75	3.9	2.50	3.4	1.25	1.7	-
Trebbiano t.	1.25	1.3	0.80	1.1	0.85	1.2	=

EVOLUZIONE DELLA SUP. VITATA VENETA IN ALCUNI VITIGNI (ha x 1000)

Vitigni	1980		2000		2010		Tend.
	Sup.	%	Sup.	%	Sup.	%	
Raboso Piave	3.80	4.0	1.44	2.0	0.95	1.3	-
Moscato b.	0.50	0.5	0.46	0.6	0.37	0.5	=
Verduzzo f.	0.95	1.0	0.84	1.1	0.35	0.5	-
Verduzzo t.	2.40	2.5	1.65	2.2	0.73	1.0	-
Sauvignon b.	0.30	0.3	0.65	0.9	0.54	0.7	+
Refosco p.r.	-	-	0.10	0.1	0.43	0.6	+
Pinot n.	0.18	0.2	0.11	0.1	0.51	0.7	+
Malv. istr.	-	-	-	-	0.12	0.2	
Manzoni bianco	-	-	-	-	0.25	0.3	

DIMINUZIONE DELLA SUP. VITATA VENETA DI ALCUNI VITIGNI DAL 1982 AL 2010

Vitigni	Sup. - (ha x 1000)	Sup.₁₉₈₂- %	Sup.₂₀₁₀- %
Merlot	24	33	10.7
Tocai f.	2.5	3.9	1.7
Trebbiano t.	0.4	1.3	1.2
Raboso P.	2.8	4	1.3
Verduzzi	1.3	2	0.7

AUMENTO DELLA SUP. VITATA VENETA DI ALCUNI VITIGNI DAL 2000 AL 2010

Vitigni	Sup. + (ha x 1000)	Sup.₂₀₀₀ %	Sup.₂₀₁₀ %
Corvina	1.8	5.2	9.2
Cab. fr. e Sauv.	7.8	5	17.4
Prosecco (Glera)	15	6	21.7
Chardonnay	2.2	2.1	5.8
Pinot g.	7	0.3	10
Sauvignon b.	0.25	0.3	0.7
Refosco p.r.	0.4	-	-
Pinot n.	0.35	0.2	0.7
Malvasia istr.	0.12	-	-
Manzoni bianco	0.25	-	-

**PRODUZIONE VIVAISTICA DI ALCUNI
VITIGNI PRINCIPALI**

Vitigni	1974	2011
	%	%
Sangiovese	17.70	5.00
Trebbiano t.	12.70	2.00
Merlot	9.60	3.67
Barbera	6.80	1.50
Montepulciano	4.10	1.50
Trebbiano romagn.	3.10	1.31
Pinot n.	2.70	2.57
Malvasia di Candia	1.70	0.50
Malvasia lunga	1.60	0.20
Pinot b.	1.60	0.60
Dolcetto	1.60	0.40
Chardonnay		5.00
Pinot g.		2.94
Prosecco		14.25
Primitivo		2.00
Aglianico		0.70
Nero d'Avola		0.35

CONCLUSIONI

- **La piattaforma ampelografica italiana risulta, oggi, più varia e qualificata: è stata raggiunta una buona diffusione tra i migliori vitigni internazionali e diversi vitigni italici di qualità; la produzione vivaistica recente, inoltre, indica che si sta andando verso questa direzione.**

-Le Regioni risultano ampelograficamente più caratterizzate:

1 - Regioni che privilegiano vitigni tradizionali:
Valle d'Aosta, Piemonte, Alto Adige, Emilia Romagna, Marche, Puglia, Calabria, Sardegna;

2 - Regioni che favoriscono sia vitigni tradizionali che internazionali: Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli, Umbria, Lazio;

3 - Regioni in cui predomina un vitigno:
Liguria (Vermentino), Toscana (Sangiovese), Abruzzo e Molise (Montepulciano), Campania e Basilicata (Aglianico);

-Emergono con sempre più evidenza diversi legami vitigno-territorio (“via italiana”);

-Il rapporto tra vitigni rossi e bianchi rimane a favore dei primi, ma in misura minore.

RINGRAZIAMENTI

- Calò A., Giorgessi F., Sorbini M.

Accademia Italiana Vite e Vino

- M. Pecile, C. Zavaglia

CRA-Centro Ricerca Viticoltura

- R. Miele, G. Catarin

Regione Veneto

- M. Capriotti

AVEPA – Veneto

- F. Taglietti

Consorzio Tutela Prosecco (Conegliano, Valdobbiadene)